

LISTA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN CUIDADO PALIATIVO DE LA IAHP ©

Medicamento	Formulación	Indicación en CP por IAHP	Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS Sección, subsección e indicación
Amitriptilina*	50-150 mg comprimidos	Depresión Dolor neuropático	24.2.1 - Trastornos depresivos
Bisacodilo	10 mg comprimido 10 mg supositorios rectales	Estreñimiento	No incluido
Carbamazepina**	100- 200 mg comprimidos	Dolor neuropático	5 - Anticonvulsivos/antiepilépticos 24.2.2 - Trastornos bipolares
Citalopram (o cualquier otro SSRI genérico equivalente excepto paroxetina o fluvoxamina)	20 mg comprimidos 10 mg/5ml solución oral 20-40 mg inyectable	Depresión	No incluido
Codeína	30 mg comprimidos	Diarrea Dolor - leve a moderado	2.2 - Analgésicos opiáceos 17.5.3 - Antidiarreicos
Dexametasona	0.5-4 mg comprimidos 4 mg/ml inyectable	Anorexia Nausea Dolor neuropático Vómito	3 - Antialérgicos y anafilaxia 8.3 - Hormonas y antihormonas
Diazepam	2.5 -10 mg comprimidos 5 mg/ml inyectable 10 mg supositorios rectales	Ansiedad	1.3 - Sedación preoperatoria y sedación breve 5 - Anticonvulsivos/antiepilépticos 24.3 - Ansiedad generalizada, trastornos del sueño
Diclofenaco	25-50 mg comprimidos 50 y 75 mg/3ml inyectable	Dolor - leve a moderado	No incluido
Diphenhydramina	25 mg comprimidos 50 mg/ml inyectable	Nausea Vómito	No incluido
Fentanilo (parche transdérmico)	25 microgramos/hr 50 microgramos/hr	Dolor - moderado a severo	No incluido
Gabapentina	300 mg o 400 mg comprimidos	Dolor neuropático	No incluido
Haloperidol	0.5 - 5 mg comprimidos 0.5 - 5 mg gotas 0.5 - 5 mg/ml inyectable	Delirio Nausea Vómito Agitación terminal	24.1- Trastornos psicóticos
Butilbromuro de hioscina	20 mg/1ml solución oral 10 mg comprimido 10 mg/ml inyectable	Nausea Congestión respiratoria terminal Dolor visceral Vómito	No incluido
Ibuprofeno	200 mg comprimidos 400 mg comprimidos	Dolor - leve a moderado	2.1 - Analgésicos no opiáceos y AINEs
Levomepromazina	5 - 50 mg comprimidos 25 mg/ml inyectable	Delirio Agitación terminal	No incluido
Loperamida	2 mg comprimido	Diarrea	No incluido
Lorazepam***	0.5-2 mg comprimidos 2 mg/ml liquido/gotas 2-4mg/ml inyectable	Ansiedad Insomnio	No incluido
Acetato de Megestrol	160 mg comprimido 40 mg/ml solución	Anorexia	No incluido
Metadona (Liberación inmediata)	5mg comprimido 1 mg/ml solución oral	Dolor - moderado a severo	24.5 -Programas de dependencia por sustancias
Metoclopramida	10 mg comprimido 5 mg/ml inyectable	Nausea Vómito	17.2 - Antiemeticos
Midazolam	1-5 mg/ml inyectable	Ansiedad Agitación terminal	No incluido
Aceite mineral	Enema		No incluido

Mirtazapine (o cualquier otro genérico de acción dual NassA o SNRI)	15-30 mg comprimidos 7.5-15 mg inyectable	Depresión	No incluido
Morfina	Liberación inmediata: 10-60 mg comprimidos Liberación inmediata: 10mg/5ml solución oral Liberación inmediata: 10 mg/ml inyectable Liberación prolongada: 10 mg comprimido Liberación prolongada: 30 mg comprimido	Dyspnea Dolor - moderado a severo	2.2 - Analgésicos opiáceos
Octreotide	100 mcg/ml inyectable	Diarrea Vómito	No incluido
Sales de rehidratación oral		Diarrea	17.5.1 - Rehidratación oral
Oxycodona	5 mg comprimido	Dolor - moderado a severo	No incluido
Paracetamol (Acetaminofen)	100-500 mg comprimidos 500 mg supositorios rectales	Dolor - leve a moderado	2.1 - Analgésicos no opiáceos y AINEs
Prednisolona (como alternativa a Dexamethasone)	5 mg comprimido	Anorexia	3 - Antialérgicos y anafilaxia 8.3 - Hormonas y antihormonas 21.2 - Agentes anti inflamatorios
Sen (senósidos)	8.6 mg comprimido	Estreñimiento	17.4 - Laxantes
Tramadol	50 mg comprimidos/capsulas 100mg/1ml solución oral 50mg/ml inyectable	Dolor - leve a moderado	No incluido
Trazodona	25-75 mg comprimidos 50 mg inyectable	Insomnio	No incluido
Zolpidem (Aún bajo patente)	5-10 mg comprimidos	Insomnio	No incluido

Complementario : Requiere de entrenamiento y/o métodos de aplicación especiales

* Dosis limitada por los efectos secundarios

**Alternativas a la amitriptilina y los antidepresivos tricíclicos (debe tener por lo menos una droga además de la dexametasona)

*** Para uso breve en insomnio

Notas:

Las Benzodiazepinas no deben ser utilizadas en los ancianos

Los Anti Inflamatorios no Esteroides (AINEs) deben ser utilizados por periodos cortos de tiempo

NINGUN GOBIERNO DEBE APROBAR MORFINA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, FENTANYL NI OXYCODONA SIN GARANTIZAR TAMBIEN LA DISPONIBILIDAD DE MORFINA DE LIBERACIÓN INMEDIATA

Esta Lista esta registrada con derechos de autor por la IAHP. La organización autoriza la reproducción gratuita, impresión y publicación de esta Lista con la citación y referencia apropiadas.